

Arbeitsanweisung

Was	Reinigung und Desinfektion von transvaginalen Ultraschallsonden
Wann	Unmittelbar nach der transvaginalen Ultraschalluntersuchung
Wo	Untersuchungsraum
	Reinigung und Desinfektion
Womit	<ul style="list-style-type: none"> • Handschuhe • 1 trockenes Tuch • 2-3 desinfektionsmittel-getränkte Einmaltücher • Produktname: _____ Einwirkzeit: _____ • <i>Wenn vom Hersteller des Desinfektionsmittels gefordert:</i> Trinkwasser zum Abspülen
Wie	<ul style="list-style-type: none"> • Nach Untersuchungsende wird die Schutzhülle von der Ultraschallsonde entfernt und entsorgt. • Zur Vorreinigung werden die Reste des Kontaktgels mit einem trockenen Tuch entfernt. • Für die Reinigung wird die Sonde mit einem desinfektionsmittel-getränktem Einmaltuch von proximal nach distal abgewischt. Insbesondere werden Fugen und Kanten auf sichtbare Verschmutzungen geprüft. Anschließend wird das Tuch verworfen. • Zur Desinfektion wird die Sonde mit einem neuen desinfektionsmittel-getränkten Einmaltuch vollständig durch mehrmaliges Wischen und rotierenden Bewegungen benetzt. Die vom Hersteller vorgegebene Einwirkzeit wird beachtet. • Handkontaktflächen wie Kabel, Tastatur, Sondenhalterung und bei Bedarf die Flasche mit Ultraschallgel werden ggf. mit einem dritten desinfektionsmittel-getränkten Einmaltuch gereinigt und desinfiziert. • Die Handschuhe werden entsorgt und die Hände desinfiziert. • <i>Wenn vom Hersteller gefordert:</i> Die Sonde wird nach Ablauf der Einwirkzeit unter fließendem Wasser abgespült.
Wer	untersuchende Person
Mitgeltende Unterlagen	<ul style="list-style-type: none"> • Produktinformation/Herstellerangaben zum Ultraschallgerät und Desinfektionsmittel • Reinigungs- und Desinfektionsplan